

(平不余)

本館代售 靈驗藥口即
丹方一味，氣節名醫，我中
醫治病之奇効，殊出人意料
之外，每有數年沉痾，見効
一旦，纏綿之症，愈於霍然
本館有鑒於此，是以有代
售各地靈藥之發起，凡各埠
之讀者，如有的獲靈驗之方
而會經試驗有效者，製爲
丸藥，本館願代爲推銷，大
開病家方便之門，謀諸人羣
幸福之途，此本館發起斯舉
之微旨也。

· 耗用費

<p>肝癰 散痛定</p> <p>蓋癰肝女 愈肝病子 無疔弄 定瘡發 比痛聲</p> <p>三大每價 角洋盒目</p>	<p>新最 丸濁白</p> <p>其清淋濁 功利滴管 甚療不制 速精疾疝</p> <p>五大每價 角洋瓶目</p>	<p>出新 丸腦保</p> <p>一醒鼻月 服臭流 即異濁 愈常涕</p> <p>五大每價 角洋盒目</p>
---	---	--

100

至十二句鐘、口內會干燥、
入睡、睡後一二句鐘復醒如
迷日如是、兼之鼻流清涕數
惟服消燥劑及野麥則夜稍安

(楊志一)

不能飲湯 陽亢不入於陰、
濟、加以虛火灼津、津少土
白、一錢半 五味子三分上
元錢半 琥珀多寡一錢吞
杜鵑四分 阿膠珠三錢 柏子
肉桂、分(懷九吞、不入煎)

元路遠丸

路北首
八號
方
一律遲
取方
日

秘儀署

◀ 第五十六期 ▶
 (日八念月三十年七十國民)
◀ 分二洋售份每 ▶
 (號八七四里德路江浙海上址館)

均排於新開之 旁如欲入新 中長期面議	廣告價目 每五方寸一 每刊每格(五 均排於新開之 旁如欲入新 中長期面議	代現九十五 國外加倍郵 國內外埠一 年二元寄費 每三月一元	定報價目 每三個月一 每三個月一 每三個月一
--------------------------	---	---	---------------------------------

抱
含
雲

最近蘇州上塘街萬昌盛號煤匠蔣德祥之妻，忽在半夜失去乳孩，後經向鄰調查，始悉爲生母所服藥云云。此舉雖屬無心，然可見中國婦女對於調查兒法之不注意，更可知中國乳孩每年屈死於「抱睡」(含乳)「蒙被」(同睡)之下者，不知幾許人也。彼蘇州之乳孩，不過其由之一耳。今將種種流弊，分述於下俾世之爲父母者，知所禁戒也。

抱孩

將乳孩抱緊，實爲脫離之最大原因，蓋人在熟睡之時，知覺頓失，人雖也可親可愛之嬌兒在手，亦失去其保護之責。偶一翻身，往往將乳孩攔腰壓死，此種現象，時有所聞，故欲謀小兒安全計，欲免小兒危險脫離，當以下包養爲上策。

均

乳孩被壓睡

均是殺害乳孩之利器



.....

期要目

殺毒乳孩之利器
麝香之研究
陰毛之有無問題
怪病奇治
治疔略談
醫林舊語
小兒啼哭之原因
醫海燃犀記

期 滿 回

愛子之心，人皆有之，惟愛之而不致於溺愛，斯爲可貴耳，否則，未寒而衣裘，未飢而進食，不但無益，反而有害，是愛之適足以害之也。邇來時局令爲父母者，每恐愛子之受寒，於是使其蒙被而睡，而不知於呼吸方面，十分泥濘和困難，小則失去嬰兒肌膚中自然之抵抗力，大則釀成惡斃之慘劇。

●同睡

欲解決以上種種之流弊，惟有母子不同睡，歐美各國，對於嬰孩，每另製小牀，四週有邊，置於大牀之旁，既無跌仆之慮，又得衛生之道，而以上之種種危險，均可因之而避免，奉我國之慈母，咸知

一面

外出一而後捕之此法似以魔力助勝、但良青雅樂、補足使勝者神往、未易驅靡匠外出也、

陰毛之有無問題 (彭祖壽)

余不敏、對於生理醫道、素鮮研究、故於身體結構組織、上、常發生疑義、即以陰毛之有無一問題論之、疑團之未漸到發育年齡後、陰毛即逐漸生長、葉芽然非其然、佈滿陰部、然有少數男女、以生理特殊故、一毛不殖、童山人云、男稱青龍、女稱白虎、濯濯、俗謂之白板、據一般人之云、男稱青龍、女稱白虎、如雙雙交配、則青、反之則凶、此則陰毛之有無又流及至命運矣、世有精深之生理研究、及醫道詳明者、請察余之疑團、并懇對此問題、作切實可靠之答復、茲幸

一個患重舌症之病人

因外、尋覓食物而又尋常顯類，每喜結羣遊行廢厠則獨行驚駭，鮮有見其二頭同行者。彼等以野草、苔蘚、花子、樹葉及一種酸腐之枝幹爲其主要食料。凡廢厠之專以此種樹根之枝幹爲食料者，據醫分藏人之報告較富，而品質亦較優，最易之相傳，更謂廢厠之食蛇者，概不食蛇者易於捕捉，因中蛇之毒以致無所不齊走避也。此蛇雖雌雄均以臍角，摸觸如橡膠視之不易分辨，追賴加檢察則見彎曲，有巨齒向前直出，後端略扁底之足，殊覺堅向有力，後足

○一個患重舌症之病人
（韋成之〔中和代作〕）
余春間月初六日距診所十里之程，有一男子來詢余重舌症能醫否，余遂憶數年前在首都某藥師處，曾見此症，余即答曰：可被日醫如此，諸先生至舍下一診，余遂檢點診金，步至該宅，詢悉病者爲雙姓，年三十七，云前月念八日發生此症，會就治薛錫堂鎮東醫士，內則服藥敷劑，外則以湯水藥貼於患之外部，思應以冰散敷擦之，不見功效，反而湯水難下，言畢示其脈象兩寸沉關洪瀉，但一觀其舌，舌尖上頂於上腭，舌下重舌長約寸許，類雞豬肝狀，而舌之周圍均有此現象，余思外科諸書，雖有治法，莫過內投湯心湯，外敷肥脾散，余固先大父有專製喉科化毒丸，於喉科見大功效，余乃以此丸投之數粒，復按以增液湯加生薑一劑，外以大荔法烙之，次日痛頓失，再以原方重川連山梔又二劑，霍然全愈，已精神煥發，談吐文雅矣。（下期續煥文先生稿）

敵精遺

分事務所法界麥賽爾蒂羅路寶康里五十六號 電話西五八二三號

(姚夢石)

丁名不同，與其部位關係，而論若一也。處方難治，各隨所宜，藥行不礙，常用何位，察形辨色，在乎心得，非一定也，其外療手續，總不外去腐拔毒，生肌而已。

疔瘡不吊此方板靈

犀角五分	磁砂五分	耳衣五分	紅升二兩	寒水石一兩
杜鵑灰五分	麝香一分	硃砂一兩	沒藥五分	淨嗣絨五分
白丁香五分	即雀屎八分	頭釐者可用、經斷三錢在烈日中化開焙黃		
石各研細末和勻水泛為丸或燒用磁瓶收貯非令走氣				
無之，不論大小。用刀鑿開，將此丸似粒大，插入便化毒消腫，萬				
無失之，立馬回行丹丹（方載外科金鑑）用法同前，千葉向杭州胡				
慶餘贈之，每粒價一分				

(一)藥吊在昇樂師購測(如浙之新市(周弗通)陳市張生堂均有)

念陳愈佳

(二)五種丹即紫金錠(藥錫均備)塗一切無名腫毒加蟾酥少許

太乙回生丹

加以冰葉、瘡也、施以局部之

口小兒啼哭之原因

〔朱潛〕

醫林傳語（許醒民）
余非醫也，亦不解醫道。姑以區區之意、言人所共知之經驗，余也姑妄言之、讀者亦姑妄聽之也可。
無良醫、毋寧不醫、不醫或可自全、而誤於庸醫者、正不少耳。傷風咳嗽、不可漫不經意、亦不可大驚小怪、漫不經意、固足以釀成大疾矣、我亦見有大驚小怪而釀成大病者、
貧兒多疾病、富兒多疾病、貧兒從視之而生、富兒珍護之多而死——我人當略識藥性醫理、不致百無見地、愚居於庸醫、所詔名醫者、名耳、其真學識之有無、不敢必、而非名醫者、我正欲其多良醫也。
國醫徒知攻過、不探病原、熱也

要發自母腹中出、受外界之冷氣、及光熱之刺激發生、始有啼聲、可知啼哭雖如生理自然之作用、功能擴張肺部、運動呼吸、增快血行、發育身體者也、故小兒天然之啼哭、不必遏止之每次啼哭之時間、以十五至二十分鐘為適度、小兒天然之哭狀、聲大有力、且有呼號之狀、此乃康健兒之哭狀也、小兒啼哭有數種、原因如下、

一、太冷或太熱、二、饑餓或口渴、三、蓋布尿濕、四、衣服太緊、五、有所痛傷、六、疾病、七、習慣性、小兒啼哭既有如上通之名稱、故其啼哭之聲音與狀態、亦隨之而不同、須詳細審視、按其原因因而治之、

一、若因太熱、察其是否出汗、蓋襪子易出汗、汗後受冷、易致感冒、故須察察使其手足勿可寒冷、加以溫覆、嬰兒之足、最難寒時、若防因寒、察其手足涼熱、如何令受冷、宜用熱水袋暖之、冬季穿絨絨褲、則換尿布時、亦不受冷、二、饑餓之狀、頻哭不斷而無力、凡有厭煩之表示也、口常作嘔嚼狀、以物觸乳、即開口吮乳、此乃厭煩之表示也、須察看乳質身體如何、乳汁如何、酌量加增其飲料、三、尿布濕污、下部不乾、亦欲啼哭、更換潔淨、即安靜無事矣、四、如臀部濕澀不動、致紅腫或傷而痛、則亦常欲啼哭、因痛而哭之狀態、聲音尖利、哭時斷續無定、因痛止後、哭亦停止、復痛則再哭、故其哭斷續不定之屈曲兩腿、雙手掙動不安、雙眉緊蹙、淚痕甚多、此乃有痛之表示也、須察其內衣、有否如蠶屎蟲等、噴嚏、此當察察其大便顏色次數如何、腹脹部與胃部有不舒服、因小兒體弱、自不知懷、易患腸病、引起腹痛甚多、